

Growing Guide for Canna Tropical

(Canna x generalis)

Stage 1 (Germination)

Sowing Media: Use a well-drained, disease-free, peat moss with pH 6.2-7.0

Sowing: Soaking seeds in water for 10-14 hours will soften the seed coat and improve germination. Use 104 holes seedling tray. Sow seeds fairly deep (at least 1.5x its diameter). Cover the seeds with fine vermiculite.

Germination: 8-12 days

Moisture: Keep peat moss wet (when wet, peat moss is dark brown color)

Fertilizer: EC <0.5 mS/cm

Stage 2 (After Cotyledons Emerge)

Moisture: Allow peat moss to dry slightly to allow the roots to penetrate into the media before watering again.

Fertilizer: EC <0.75 mS/cm

Stage 3 (After Transplanting Out From Sowing Tray)

Pot Size: At least 6" for best branching

Soil level: Should be as deep as the length of first set of leaves

Fertilizer: EC 0.75-1.2 mS/cm

Crop Scheduling

Sow to transplant (seedling tray 104 holes): 4 - 5 weeks

Transplant to finish in 6" pot: 4 - 5 weeks

Total crop time from sow to finish: 8 - 10 weeks

Maklumat Penanaman Untuk Canna Tropical (Canna x generalis)

Peringkat 1 (Percambahan)

- Media Semaian:** Gunakan peat moss bersaliran baik dan tidak berpenyakit dengan pH 6.2 - 7.0
- Semaian:** Rendamkan biji benih dalam air untuk 10 - 14 jam bagi melembutkan lapisan luar biji benih bagi meningkatkan kadar percambahan. Gunakan dulang semaian 104 lubang. Kebumikan biji benih sekurang-kurangnya 1.5 diameternya sendiri dalam peat moss. Litupi biji benih dengan lapisan nipis vermiculite.
- Percambahan:** 8-12 hari
- Kelembapan:** Pastikan peat moss kekal lembap (apabila lembap, peat moss adalah berwarna coklat gelap)
- Baja:** EC <0.5 mS/cm

Peringkat 2 (Selepas Kemunculan Kotiledon)

- Kelembapan:** Biarkan peat moss mengering sedikit bagi membolehkan akar menembusi media sebelum menyiram semula.
- Dalam Tanah:** Kedalaman tanah perlu setinggi set daun yang pertama
- Baja:** EC <0.75 mS/cm

Peringkat 3 (Selepas Pemindahan Dari Dulang Semaian)

- Saiz Pasu:** ≥6 inci bagi cabang yang baik
- Baja:** EC 0.75-1.2 mS/cm)

Jadual Penanaman

Semaian sehingga pemindahan (dulang semaian 104 lubang):
4 - 5 minggu

Pemindahan sehingg dewasa dalam pasu 6 inci:
4 - 5 minggu

Jumlah masa tanaman dari semaian sehingga dewasa:
8 - 10 minggu

种植信息

美人蕉-热带系列 (Canna Tropical)

第 1 阶段 (发芽阶段)

- 介质 : 请用排水良好和无病而含有 pH 6.2 至 7.0 之间的泥炭土
- 播种 : 浸种在水中 10 至 14 小时会软化种皮, 提高种子发芽。请用 104 洞的播种托盘。请把种子埋在泥炭土里 (至少直径的 1.5 倍)。轻轻的使用蛭石来覆盖种子。
- 发芽天数 : 8 至 12 天
- 水分 : 第四级 (请保持泥炭土的湿润, 确保它是黑巧克力色的)
- 施肥 : EC <0.5 mS/cm

第 2 阶段 (子叶出现后)

- 水分 : 再浇水前, 让土壤的水分干涸一点, 使基层打入介质)
- 施肥 : EC <0.75 mS/cm

第 3 阶段 (移植后)

- 花盆尺寸 : 至少 6 寸来确保最佳分支
- 土壤深度 : 深度要和第一批的叶子长度相同
- 施肥 : EC 0.75-1.2 mS/cm

作物调度

- 播种移植 (104 洞的播种托盘) : 4 至 5 周
- 移植到完成 (在 6 寸盆里) : 4 至 5 周
- 作物播种共计时间 : 8 至 10 周