

Growing Guide for **Dianthus Amazon | Dash | Floral Lace | Ideal Select** (*Dianthus barbatus interspecific | barbatus | chinensis x barbatus*)

Stage 1 (Germination)

Sowing Media:	Use a well-drained, disease-free, peat moss with a pH of 5.8-6.2.
Sowing:	Use 200 holes seedling tray.
Germination:	3-4 days
Light:	Required
Moisture:	Keep peat moss wet (when wet, peat moss is dark brown color)

Stage 2 (Growth & Development of True Leaves)

Soil pH:	Maintain similar soil pH as Stage 1
Fertilizer:	Fertilizer twice a week with N: 0.5 ml per 10 liters of water and continue until plugs are grown.
Growth Regulator:	Use 6 ml Bonzi per 100 liters of water after 3 weeks for toning for only once.

Stage 3 (Growing On)

Media:	Use a well-drained, disease-free, peat moss with a pH of 5.8-6.5
Fertilizer:	Use calcium-based fertilizer or 15-5-15 at 1.5 ml per 10 liters of water 1-2 times a week.
Growth Regulator:	To control height in general, apply 2-3 times 2 ml Bonzi per 100 liters of water. First application can be done 2 weeks after transplant, and thereafter on weekly basis.

Crop Scheduling

Total crop time from sow to finish:	12-13 weeks
--	-------------

Maklumat Penanaman

Dianthus Amazon | Dash | Floral Lace & Ideal Select

(Dianthus barbatus interspecific | barbatus | chinensis x barbatus)

Peringkat 1 (Percambahan)

Media Semaian: Gunakan peat moss bersaliran baik dan tidak berpenyakit dengan pH 5.8-6.2.
Semaian: Gunakan dulang semaian 200 lubang.
Percambahan: 3-4 hari
Cahaya: Perlu
Kelembapan Media: Pastikan peat moss lembap (Apabila lembap, peat moss berwarna coklat gelap)

Peringkat 2 (Pertumbuhan Daun Sebenar)

pH Tanah: Kekalkan pH tanah sama seperti Peringkat 1.
Baja: Bubuh baja dua kali seminggu dengan N: 0.5 ml per 10 liter air dan teruskan sehingga anak benih membesar.
Penggalak: Gunakan 6 ml Bonzi dalam 100 liter air selepas 3 minggu untuk sekali sahaja

Peringkat 3 (Pertumbuhan Seterusnya)

Media: Gunakan peat moss bersaliran baik dan tidak berpenyakit dengan pH 5.8-6.5.
Baja: Gunakan baja berdasarkan kalsium atau 15-5-15 pada 1.5 ml per 10 liter air 1-2 kali seminggu.
Penggalak: Secara umumnya, untuk mengawal ketinggian, gunakan 2 ml Bonzi per 100 liter air 2-3 kali. Pada kali pertama, gunakan 2 minggu selepas pemindahan dan kemudiannya setiap minggu.

Jadual Penanaman

Jumlah masa tanaman dari semaian sehingga dewasa: 12-13 minggu

种植讯息

石竹：亚玛逊系列 | 石竹：短跑系列 | 石竹：丁香花花边系列 |
石竹：精选完美系列

(Dianthus Amazon | Dash | Floral Lace | Ideal Select)

(Dianthus barbatus interspecific | barbatus | chinensis x barbatus)

第 1 阶段 (萌芽需要 3 至 4 天)

播种介质：请用排水良好和无病菌且含有 pH 5.8 至 6.2 之间的泥炭土。

播种：请用 200 洞的播种托盘。

阳光：需要

水分：请保持泥炭土湿润（泥炭土湿润时是呈深巧克力色的）。

第 2 阶段 (胚子出现后)

土壤 pH：和第一阶段一样

施肥：每周请化 0.5 ml 氮 (N) 在每 10 公升水里施肥两次，并持续直到幼苗长出。

生长调节剂：三周后，使用仅一次 6ml 威尔斯在 100 公升水里以保持胚子的水分。

第 3 阶段 (成长过程)

介质：请用排水良好和无病菌且含有 pH 5.8 至 6.5 之间的泥炭土。

施肥：每周 1-2 次使用含钙质的肥料或 1.5ml 15-5-15 在每 10 公升水里施肥。

生长调节剂：为了控制在统一的高度，请使用 2-3 次 2ml 威尔斯在每 100 公升水里。可在移植两星期后第一次使用，接着每星期使用一次。

农作物调度

作物播种共计时间

: 12 至 13 周